



**WP LAB**  
Indústria Farmacêutica

# **Forteviron®**

## **Anti-Age**

### **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

Nome comercial: FORTEVIRON ANTI-AGE®

Insumos ativos: Ambra grisea, Baryta muriatica, Conium maculatum e Lycopodium clavatum

#### **Medicamento Homeopático**

#### **APRESENTAÇÕES**

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 60 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

#### **USO ADULTO**

#### **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido de 250 mg de FORTEVIRON ANTI-AGE® contém:

Ambra grisea .....	5CH .....	0,00625 mL
Baryta muriatica .....	5CH .....	0,00625 mL
Conium maculatum .....	6CH .....	0,00625 mL
Lycopodium clavatum .....	6CH .....	0,00625 mL
Excipientes q.s.p. ....		250 mg
Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício)		

#### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

##### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

FORTEVIRON ANTI-AGE® é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas decorrentes do envelhecimento natural ou precoce (perda de memória, esquecimento, vertigens, diminuição do tônus muscular, desmotivação, melancolia, desejo de solidão, insônia e emagrecimento), desde que descartadas outras hipóteses diagnosticadas mais graves relacionadas a esses sintomas.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

##### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

FORTEVIRON ANTI-AGE® é um medicamento homeopático, que

tem seu mecanismo de ação baseado na Lei dos Semelhantes, na qual os sintomas de uma moléstia são curados pelo agente que o produz.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios. A experimentação consiste em administrar substâncias em indivíduos sadios para elucidar os sintomas que irão refletir sua ação, ou seja, o potencial medicamentoso. A partir desta experimentação surgem as matérias médicas, que indicam a totalidade dos sintomas que cada ativo poderá promover, em busca da cura da patologia.

##### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C” de risco de gravidez).**

O que significa risco de gravidez “categoria C”? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

**Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.**

**Até o momento, são desconhecidas outras contraindicações do medicamento FORTEVIRON ANTI-AGE®.**

##### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

**Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento FORTEVIRON ANTI-AGE®.**

**Este medicamento contém LACTOSE.**

**Até o momento, são desconhecidas interações no uso do medicamento FORTEVIRON ANTI-AGE® associado a alimentos, medicamentos e bebidas alcoólicas.**

**Até o momento, são desconhecidas alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento FORTEVIRON ANTI-AGE®.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

##### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C).

Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Os comprimidos de FORTEVIRON ANTI-AGE® são brancos, circulares e sem odor (inodoros).

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no**

aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia sugerida:

### ADULTOS

Tomar 2 (dois) comprimidos pela manhã e 2 (dois) comprimidos à noite, ou conforme orientação médica.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 50 (cinquenta) dias, consulte um profissional de saúde.**

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Continue seguindo corretamente o modo de usar descrito nesta bula.

## 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento FORTEVIRON ANTI-AGE®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br).

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

## 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma

grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC n.º 238/2018.

Farmacêutica Responsável: Dr.ª Giselle da Costa Mateus CRF - PR 16959

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Eireli.

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Indústria Brasileira

SAC: Fone: (41) 3013-6464 | [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br)



**WP LAB**  
Indústria Farmacêutica

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.



V00-BP